

Trichopterele (Insecta: Trichoptera) din zona Cheile Someșului Cald (Ic Ponor)

UVÁROSI Lujza

Abstract:

Caddishflies (Insecta: Trichoptera) from Someșului Cald Gorges area (Apuseni Mountains, Romania)

În the year 1998 a few itinerant collection was made on the upper part of the Someșul Cald river. A number of 21 trichoptera species, belonging to 4 families were collected with daytime sweeping and night capturing (lighting). List of material are presented. Short faunistical and ecological comments with remarks on the endemic and rare species are also given.

Introducere

Munții Apuseni, cu o rețea hidrografică variată, adăpostește o bogată faună de trichoptere. Catalogul trichopterelor din România (CIUBUC 1993) menționează 101 specii de trichoptere din această regiune, de unde face parte și zona Cheile Someșului Cald. Acest număr reprezintă 38% din fauna de trichoptere de la noi.

Date asupra faunei de trichoptere din zona Cheile Someșului Cald (Ic Ponor) găsim în lucrările lui L. BOȚOSĂNEANU (1959 1961 1975), care menționează 6 specii de trichoptere (endemisme și specii subtroglofile colectate din diferite peșteri de-a lungul cursului superior al Someșului Cald).

Cercetările noastre au vizat în special ecosistemele hidrofile și acvatice de-a lungul cursului superior al Someșului Cald, colectând numai adulți, stadiile larvare nu pot fi determinate cu exactitate până la specie.

Material și metode

Colectările au fost efectuate în perioada iunie - noiembrie 1998. Probele calitative au fost luate ziua din 6 puncte diferite, prin cosirea cu fileul entomologic a vegetației de pe malul apei, în funcție de caracteristicile sistemului lotic unde se dezvoltă stadiile larvare. Stațiunea nr. 1 se află la intrarea în chei, Someșul Cald având caracterul de pârâu de munte, cu viteza de curgere mare, torrenti impetuosi, stânci și bolovani mari. Stațiunile nr. 2, 3, și 4, au fost amplasate la distanțe egale de aprox. 400 – 500 m una față de alta de-a lungul Someșului Cald. În acest sector, prin deschidere treptată a văii în aval, curgerea apei devine mai lentă, fundul apei este acoperit cu pietriș rulat, ceea ce favorizează o biodermă mai bogată cu mușchi și alge pe bolovani. Am considerat caracteristice și biotopurile formate în jurul izvoarelor mici, bălțile cu ape mai mult sau mai puțin stagnante situate la aprox. 100 de m de la marginea cursului principal pe versantul stâng (Stațiunea nr. 5). Stațiunea nr. 6 se află în zona incipientă a lacului de acumulare de la Smida.

Probele cantitative au fost luate din 2 puncte diferite, la intrarea în chei (stațiunea nr. 1) și la Doda Pilii, la aprox. 15 km. Aval de la intrare în chei (stațiunea nr. 7). Colectările cantitative au fost făcute seara cu un generator tip Honda, având ca sursă luminoasă un bec cu vaporii de mercur de 250 W. Materialul colectat a fost conservat în alcool 80% și studiat în laborator pentru identificarea speciilor.

Au fost prelucrate în total 233 exemplare din care au fost determinate 21 specii de trichoptere, aparținând la 4 familii.

Rezultate și discuții

Prezentăm lista taxonomică a speciilor de trichoptere identificate din zona Cheile Someșului Cald, utilizând nomenclatura dată de BOTOȘANEANU & MALICKY (1978).

Rhyacophilidae

Rhyaciphila fasciata HAGEN 1859, stat nr 1 11. sept., 2 ♂♂

R. mocsaryi Klapalek 1898, stat. nr 1. 29 iulie, 2 ♂♂.

R. rubula ZETTERSTEDT 1840; stat nr. 7 8 iunie 1 ♂ 1 ♀

R. orghidani BOTOȘANEANU 1952, stat nr 1 8 iunie 1 ♂, 5 ♀♀, stat nr 2 8 iunie 1 ♂, stat nr 3 8 iunie, 5 ♂♂, 2 ♀♀, stat nr 4 8 iunie 1 ♂

R. polonica MCLACHLAN 1879; stat. nr. 1-11 septembrie, 7 ♂♂.

R. torrentium PICTET 1834; stat nr 1 29 iulie, 5 ♂♂, 11 septembrie 10 ♂♂, 5 ♀♀, stat nr 2 11 septembrie 1 ♂

Hydropsychidae

Hydropsyche sp indet., stat nr 7 8 iunie, 9 ♀♀

Psychomyidae

Psychomyia pusilla FABRICIUS 1781, stat. nr 3 8 iunie 1 ♀; stat nr 7: 8 iunie 1 ♂ 1 ♀

Limnephilidae

Drusus tenellus Klapalek 1898, stat nr 4 8 iunie 1 ♀

Ecclysopteryx dalecarlica KOLENATI 1848, stat nr 2 8 iunie 1 ♂ 1 ♀; stat nr 7: 8 iunie, 8 ♂♂ 12 ♀♀

E. madida MCLACHLAN 1867; stat. nr 1-29 iulie, 23 ♂♂, 20 ♀♀; 11 septembrie 12 ♂♂ 10 ♀♀; stat nr. 2 11 septembrie, 4 ♀♀

Limnephilus griseus L. 1759; stat nr 1 11 septembrie 1 ♂

Grammotaulius nigropunctatus RETZIUS 1783; stat. nr 1-11 spetembrie 1 ♀

Rhadicoleptus alpestris meridiocarpaticus BOTOȘANEANU & RIEDEL 1965; stat nr 2: 8 iunie 1 ♂

Potamophylax cingulatus STEPHENS 1837; stat nr 1-29 iulie, 2 ♀♀ 11 spetembrie 1 ♂

Potamophylax luctuosus PILL & MITT 1793; stat nr 3-8 iunie 1 ♂

Parachiona picicornis PICTET 1834, stat nr 5-8 iunie 16 ♂♂ 1 ♀; stat nr 6 8 iunie 1 ♂

Stenophylax meridiorientalis MALICKY 1980, stat. nr 7 8 iunie 1 ♀

Allogamus auricollis PICTET 1834; stat nr 1 11 septembrie, 37 ♀♀, stat nr 2 11 septembrie 1 ♂

Allogamus uncatus BRAUER 1857; stat nr 3-6 noiembrie 1 ♂, 2 ♀♀

Psylopteryx curviclavatus BOTOȘANEANU 1957, stat nr 2 6 noiembrie, 2 ♂♂

Annitella lateroproducta BOTOȘANEANU 1952; stat nr 3-5 noiembrie 1 ♂; stat nr 4: 6 noiembrie, 5 ♂♂, 4 ♀♀

Din analiza rezultatelor putem aprecia, ca din cele 21 specii de trichoptere identificate din regiunea cercetată, 2 specii montane sunt foarte abundente (*Ecclysopteryx madida* cu 28,32% și *Allogamus auricollis* cu 16,3%). Abundente sunt și speciile *Ecclysopteryx dalecarlica* cu 9,44%; *Rhyacophila torrentium* cu 9,01% și *Parachiona picicornis* cu 7,72%; primele 2 specii sunt componente caracteristice pâraielor repezi curgătoare din zona montană, iar cea de-a treia specie subliniază existența a nenumăratelor izvoare și bălți formate la ieșirea izvoarelor la suprafață, cu o faună particulară, specifică de trichoptere.

Din cele 21 de specii de trichoptere 3 specii sunt endemice pentru Munții Apuseni: *Rhyacophila orghidani* BOTOȘANEANU 1952 este o specie rithrobiontă, populând izvoarele reci și pârâiașele stenoterme, cu areal limitat la cursul superior al Someșului Cald și Rece, cursul superior al Crișurilor și Arieșului (BOTOȘANEANU 1952); *Rhadicoleptus alpestris* KOLENATI 1848 prezintă o interesantă variabilitate geografică a aparatului genital, fiind descrise până acum din arealul acestei specii 4 subspecii, dintre care 2 subspecii sunt prezente și în România: *R. a. meridiocarpaticus* BOTOȘANEANU & Riedel 1965 din regiunea Banatului și Muntii Apuseni (CIUBUC 1993, PONGRACZ 1914) și *R. a. sylvanocarpaticus*

BOTOŞĂNEANU & RIEDEL 1965 din Maramureş-Bucovina (CIUBUC 1993) și Carpații Orientali (UJVÁROSI, în print). În Munții Apuseni semnalăm un nou punct de colectare alături de cel de la Stâna de Vale.

Psylopteryx curviclavatus BOTOŞĂNEANU 1957 este o specie autumnală, colectată numai toamna târziu, în zile mai calde (BOTOŞĂNEANU 1957).

În zona cercetată au fost colectate câteva exemplare de pe suprafață zăpezii în apropierea unei cascade de-a lungul Someșului Cald. Arealul acestei specii este limitat la Munții Apuseni, populând pârâiașele reci și stenoterme la altitudini de peste 1000 de m. A fost colectată din mai multe stațiuni la Stâna de Vale (BOTOŞĂNEANU 1961), Valea Arieșului și Valea Iadei (BOTOŞĂNEANU 1957).

Ca specie rară pentru fauna de trichoptere a României amintim pe *Allogamus auricollis* cu doar 2 puncte de colectare din Mării Bihor (Valea Gârda și Scărișoara) (BOTOŞĂNEANU 1965), 2 puncte de colectare în Carpații Meridionali (Masivul Retezat și Muntii Făgăraș) (BOTOŞĂNEANU 1953-1965; CIUBUC 1993) și un singur punct de colectare la Arcalia (UJVÁROSI, în print.).

Analiza ecologică a materialului colectat a dat următoarele rezultate: 12 specii sunt caracteristice exclusiv pârâiașelor din zona montană, la care se adaugă și Someșul Cald, principalul curs de apă din zona studiată. Aceste specii sunt: *Rhyacophila mocsaryi*, *Drusus tenellus*, *Ecclysopteryx dalecarlica*, *E. madida*, *Potamophylax cingulatus*, *P. latipennis*, *Stenophylax meridiorientalis*, *Allogamus auricollis*, *A. uncatus*, *Annitella lateroproduncta* și *Psylopteryx curviclavatus*, reprezentând în totalitate 62,59% din materialul colectat.

Relativ puține specii au o răspândire mai largă, fiind întâlnite și în ape curgătoare din regiunea montană (*Rhyacophila fasciata*, *R. nubila*, *R. polonica*), însemnând 4,7% din materialul colectat. Numai 2,12% din material sunt specii euribionte (*Psychomyia pusilla*, *Limnephilus griseus* și *Grammotaulius nigropunctatus*).

O abundență pronunțată a avut specia *Parachiona picicornis* (7,72%), specie indicatoare a izvoarelor și bălților formate la ieșirea izvoarelor la suprafață. Speciile endemice strict legate de anumite condiții locale din regiune intră în categoria speciilor caracteristice izvoarelor stenoterme, bine oxigenate, populând însă și pârâiașele mici, care păstrează stenotermia izvoarelor (*Rhyacophila orghidani*, *Rhadicoleptus a. merodiocarpaticus*, *Psylopteryx curviclavata*), reprezentând 7,7% din materialul colectat.

Ca o particularitate a zonei, menționăm abundența speciei *Allogamus auricollis* rară în restul stațiunilor de colectare din România.

La speciile *Parachiona picicornis* și *Allogamus auricollis* la care perioada de zbor a adulților se derulează după apusul soarelui până spre miezul nopții, am observat o decalare în sensul începerii activității de zbor cu 3 – 4 ore înainte de apusul soarelui. Acest comportament adaptativ poate fi explicat prin caracterul adânc și închis al văii care generează un microclimat întunecos și rece.

În concluzie se poate afirma că în cursul superior al Someșului Cald se conservă populațiile caracteristice de trichoptere care se dezvoltă în ecosistemele acvatice, inclusiv endemice cu o valoare ridicată, ceea ce justifică o cercetare mai sistematică a zonei.

BIBLIOGRAFIE

- BOTOŞĂNEANU L. 1952: *Rhyacophila orghidani* n. sp. (Trichoptera, Rhyacophilidae) din Munții Apuseni ai R.P.R. Comun. Acad. R.P.R., 2(11-12): 721-724.

- BOTOŞĂNEANU L., 1957: Recherches sur les Trichopteres (imagos) de Roumanie. Pol. Pis. Ent., 24-25: 383-433.
- BOTOŞĂNEANU L. 1959: Cercetări asupra trichopterelor din Masivul Retezat și Munții Banatului. Bibl. Biol. Anim. Ed. Acad. R.P.R. 1: 1-166.
- BOTOŞĂNEANU L. 1961: Matériaux pour servir à la connaissance des Trichoptères d'Europe Orientale et Centrale. Folia. Ent. Hung., Ser. Nov. 14(2): 11-91.
- BOTOŞĂNEANU L. 1975: Die endemischen Trichopteren der Karpaten. Vehr. Sechst. Int. Symp. über Entomofaunistik in Mitteleuropa: 91-103.
- BOTOŞĂNEANU L. & RIEDEL 1965: Contribution à la connaissance de la variabilité géographique de *Rhadicoleptus alpestris* KOL. (Trichoptera, Limnephilidae). Bul. Acad. Pol. Sci., 2(9): 545-551.
- BOTOŞĂNEANU L. & MALICKY H. 1978: Trichoptera. In: Illies: Limniofauna Europea. G. Fischer Verlag, Stuttgart-New York. 333-359.
- CIUBUC C. 1993: Checklist of Romanian Trichoptera (Insecta). Trav. Mus. Hist. Nat. "Gr. Antipa", 33: 11-147.
- PONGRACZ S. 1914: Enumeratio Neuropteroidum Regni Hungariae. Rovartani Iapok, 21(9-12): 145-155.

UVÁROSI Lujza
 Catedra de Zoologie
 Facultatea de Biologie - Geologie
 Universitatea "Babeș-Bolyai"
 Str. Clinicii 5-7.
 RO-3400 Cluj-Napoca

Primit la redacție / Received: 19.10.1998.

Acceptat / Accepted: 23.11.1998

Apărut / Printed: 30.11.1999